

Die Entzündung läßt rascher nach
Die Ödeme und Schwellungen gehen zurück
Blutergüsse werden rascher abgebaut
Die Heilung wird beschleunigt

Was versteht man unter entzündlichen Prozessen mit Schwellungen (Ödem)?

Dazu gehört eine große Anzahl von Erkrankungen, die oftmals mit sehr schmerzhaften Schwellungen einhergehen:

1. Entzündliche Zustände durch äußere Gewalteinwirkung (stumpfes Trauma)
Prellungen
Quetschungen
Verstauchungen
Zerrungen
Blutergüsse
2. Entzündliche Zustände nach Operationen
z.B. Kieferchirurgie und Zahnextraktion
z.B. Unterleibsoperationen
3. Akute und chronische Entzündungen
Erkrankungen der Atemwege (Nasen- und Rachenraum)
Nebenhöhlenentzündungen
Entzündungen im gynäkologischen Bereich

Auch zur Erhöhung der Wirksamkeit bestimmter Antibiotika (Tetracykline) wurde Bromelain mit Erfolg eingesetzt, so z.B. bei bakteriellen Entzündungen mit Schwellungen.

Bromelain-POS® ist allgemein sehr gut verträglich. Dieser Umstand ist im wesentlichen auf die naturbelassenen Inhaltsstoffe zurückzuführen.

Halten Sie sich bitte bei der Einnahme an die vorgeschriebene Dosierung und brechen Sie die Therapie nicht selbständig ab. Der Erfolg der Behandlung hängt wesentlich von der regelmäßigen Einnahme ab. Aus diesem Grunde hier noch einmal der Hinweis, die Tablette unzerkaut einzunehmen, denn die Magensäure würde die wertvollen Wirkstoffe teilweise zerstören und die Wirkung würde verringert.

Bromelain-POS® - ein modernes und zeitgemäßes Arzneimittel auf der Basis natürlicher Inhaltsstoffe.



Liebe Patientin! Lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Gebrauchsinformation

Bromelain-POS®

Wirkstoff: Bromelain

Zusammensetzung:

1 überzogene, magensaftresistente Tablette enthält

- arzneilich wirksamer Bestandteil

Bromelain entsprechend 500 F.I.P.-Einheiten (66,7-100 mg)

- sonstige Bestandteile

Mikrokr. Cellulose; Copovidon; Magnesiumstearat; hochdisp. Siliciumdioxid, Methacrylsäure-Methylmethacrylatcopolymer (1:1) (Ph.Eur.) (Eudragit L 100); Methacrylsäure-Ethylacrylatcopolymer (1:1) (Ph.Eur.) (Eudragit L 30 D); Diethylphthalat; Talkum; Triethylcitrat

Darreichungsform und Inhalt:

20 magensaftresistente Tabletten	(N1)
50 magensaftresistente Tabletten	(N2)
100 magensaftresistente Tabletten	(N3)
500 magensaftresistente Tabletten	Anstaltspackung

Wirkungsweise:

Pflanzliches Arzneimittel bei Schwellungen nach Verletzungen

URSAPHARM, Industriestr., D-66129 Saarbrücken,

Tel.: 06805/92 92-0, Fax: 06805/92 92-88

Anwendungsgebiete:

Akute Schwellungszustände nach Operationen und Verletzungen, insbesondere der Nase und Nebenhöhlen.

Hinweis: Bei anhaltenden, unklaren oder neu auftretenden Beschwerden sollte ein Arzt aufgesucht werden.

Gegenanzeigen:

Wann dürfen Sie Bromelain-POS® nicht anwenden?

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Bromelain (Ananas).

Bromelain-POS® sollte nicht angewendet werden, wenn Sie Medikamente zur Senkung der Blutgerinnung und/oder Anti-Thrombose-Mittel einnehmen.

 **URSAPHARM**
ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG

Was ist bei Kindern und älteren Menschen zu berücksichtigen?

Wegen der nicht ausreichend vorliegenden Untersuchungen mit Bromelain-POS® bei Kindern soll dieses Arzneimittel bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Was müssen Sie in Schwangerschaft und Stillzeit beachten?

Das Arzneimittel soll wegen nicht ausreichender Untersuchungen in Schwangerschaft und Stillzeit nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen:

Wie beeinflusst Bromelain-POS® die Wirkung anderer Arzneimittel?

Eine Verstärkung der Blutungsneigung bei gleichzeitiger Therapie mit gerinnungshemmenden Substanzen (Antikoagulantien) und Blutplättchenfunktionshemmern (Thrombozytenaggregationshemmern) durch Bromelain-POS® kann nicht ausgeschlossen werden.

Bromelain-POS® verstärkt die Wirkung von Tetracyclinen durch Erhöhung der Blut- und Urinspiegel.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung:

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Bromelain-POS® nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Bromelain-POS® sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel von Bromelain-POS® und wie oft sollten Sie Bromelain-POS® einnehmen?

Soweit nicht anders verordnet, nehmen Erwachsene und Kinder über 12 Jahre 2mal täglich eine Tablette Bromelain-POS® ein.

Wie und wann sollten Sie Bromelain-POS® einnehmen?

Bromelain-POS® sollte jeweils ca. eine halbe Stunde vor den Mahlzeiten unzerkaut mit etwas Flüssigkeit eingenommen werden.

Wie lange sollten Sie Bromelain-POS® einnehmen?

Das Arzneimittel sollte ohne ärztlichen Rat nicht länger als 8 bis 10 Tage eingenommen werden.

Anwendungsfehler und Überdosierung:

Was ist zu tun, wenn Bromelain-POS® in zu großen Mengen angewendet wurde (beabsichtigte oder versehentliche Überdosierung)?

Bei Überdosierung können die beschriebenen Nebenwirkungen verstärkt auftreten. In diesen Fällen ist das Arzneimittel unverzüglich abzusetzen und der Arzt zu informieren.

Nebenwirkungen:

Welche Nebenwirkungen können bei der Einnahme von Bromelain-POS® auftreten?

Gelegentlich kann es durch die Einnahme von Bromelain-POS® zu Magenbeschwerden und Durchfall kommen.



Gelegentlich können durch Bromelain allergische Reaktionen, z.B. Hautausschlag, ausgelöst werden. In diesen Fällen sollte Bromelain-POS® unverzüglich abgesetzt werden.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Hinweise und Angaben zur Haltbarkeit des Arzneimittels:

Wie ist Bromelain-POS® aufzubewahren?

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Das Verfallsdatum dieser Packung ist auf der Seitenlasche aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nach diesem Datum nicht mehr!

Aufbewahrungshinweis:

Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information:

August 2003

Allgemeine Hinweise für den Patienten:

Der Wirkstoff von Bromelain-POS® ist ein hochkonzentriertes Enzymgemisch in natürlicher Zusammensetzung aus dem Stamm der Ananaspflanze.

Enzyme sind biologische Katalysatoren, die von Pflanzen, Tieren und Menschen gebildet werden. Alle Enzyme haben die Aufgabe, jeweils unterschiedliche Stoffwechselfvorgänge im Körper in Gang zu bringen und zu beschleunigen. Die Enzyme aus der Ananaspflanze in Bromelain-POS® gehören zur großen Gruppe der eiweißspaltenden (proteolytischen) Enzyme.

Diese eiweißspaltenden Enzyme, auch "Bromelain" genannt, passieren die Darmwand unzerstört und sind im Blut nachweisbar. Über den Blutstrom gelangen sie im Körper dorthin, wo entzündliche Prozesse ablaufen.

Durch einen besonderen Überzug (Film) sind die Tabletten so geschützt, daß die wertvollen Wirkstoffe den Magen unzerstört passieren und erst im Dünndarm freigesetzt werden. Die Formulierung "magensaftresistente Tabletten" bringt dies zum Ausdruck. Deshalb sollten Bromelain-POS® Tabletten unzerkaut geschluckt werden!

Was bewirkt Bromelain-POS® im entzündeten Gebiet?

Abbau von krankhaften Eiweißablagerungen

Abbau von zerstörtem Gewebe und Zerfallsprodukten

Verbesserung der Fließigenschaften des Blutes und der Versorgung im entzündeten Gebiet

